

一图看懂

新冠疫苗“加强针”开打 你应该知道的10件事



为什么需要加强免疫？

- 全程接种疫苗后，随着时间的推移，会出现中和抗体水平下降的情况
- 通过增加疫苗接种针次，也就是“加强针”，可以使已经逐步减少的中和抗体快速增长或反弹，从而产生更好的保护作用

谁可以打“加强针”？



- 18岁以上
- 完成全程免疫后至少6个月（即灭活疫苗第二剂或康希诺一剂接种满6个月的人群）

哪些人群需要重点接种？



- 接触到病毒风险比较高的高风险感染人群
- 机场、边检、医院等保障社会基本运行的关键岗位人员

“加强针”接种后 抗体水平怎么样？



- 新冠灭活疫苗加强免疫后1个月检测到的中和抗体水平是第二剂次后1个月抗体水平5倍左右，有的会更高一些

如何选择疫苗产品？

- 建议使用同一个疫苗产品完成接种
- 例如，已完成2针次的灭活疫苗接种，那么第3针也要接种灭活疫苗

“加强针”能不能和其他疫苗 一起接种？



- 接种间隔应大于14天
- 因动物致伤、外伤等原因接种狂犬病疫苗、破伤风等疫苗时，可不考虑新冠疫苗与其他疫苗的接种间隔

接种“加强针”是免费的吗？



- 新冠疫苗“加强针”免疫接种仍实施免费政策

如何接种“加强针”？



- 重点人群和高风险人群接种原则上按照单位或行业组织统一实施
- 其他需要加强免疫接种的人群，可关注当地疾控部门或卫生健康委相关信息，也可咨询辖区内接种单位

接种禁忌有哪些？

- 对新冠疫苗的成分过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者
- 既往发生过疫苗严重过敏反应者
- 患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者
- 正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者
- 妊娠期妇女

接种时要注意什么？

接种前

- 携带身份证等相关证件
- 配合工作人员询问

接种后

- 现场留观30分钟，无异常才可离开
- 如发生疫苗疑似不良反应，报告接种单位，并及时就医
- 接种后仍需做好个人防护